


1 ¿Qué es una reacción adversa?

Son respuestas no deseadas y no intencionadas que se presentan después de la administración de los medicamentos contra la tuberculosis.



2 ¿Quiénes son más propensos a presentar estas reacciones?

A todos los pacientes con tratamiento antituberculoso. Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en pacientes con VIH, pacientes con tuberculosis MDR y pacientes con alguna adicción.




3 ¿Cómo se manifiesta?

Suele presentarse en el primer mes de tratamiento, algunas ceden al poco tiempo y otras pueden tratarse con otros medicamentos.

Pueden presentar:

- Náuseas
- Vómitos alimenticios o biliosos
- Malestar general
- Dolor abdominal intenso
- Ictericia (piel amarillenta)
- Urticaria (picazón y aparición de ronchas)



4 ¿Son graves estas reacciones?

Pueden manifestarse en forma leve, severa o grave. Por ello es importante que, si tienes alguna molestia o síntomas lo comuniques inmediatamente a la enfermera o al médico del programa



RECUERDA:

- No suspendas ni interrumpas tu tratamiento sin indicación médica. Las reacciones adversas se pueden manejar sin perjudicar el tratamiento contra la tuberculosis.
- Cumplir con el tratamiento antituberculoso siguiendo las pautas indicadas: horario adecuado, dosis adecuada, no ingesta de alcohol, no automedicarse.
- La mayoría de personas con tuberculosis completa su tratamiento sin efectos adversos ni complicaciones.



GUÍA PARA EL PACIENTE



 **Kaelin**
 **ibt**



www.kaelin.pe



Complejo Hospitalario Guillermo Kaelin

Aprende a reconocer las
reacciones adversas de los
medicamentos contra
la tuberculosis.